



## Heilige ibis (*Threskiornis aethiopicus*)



**Foto:** Hans van der Meulen

**Bron:** [Nederlands soortenregister](#)

De [heilige ibis](#) is een overwegend witte vogel met een gedeeltelijk zwarte nek en zwarte poten. De kop is kaal en zwart, de snavel is zwart en naar beneden gebogen. De vleugeleinden zijn ook zwart. Een volwassen heilige ibis is tussen de 65 en 90 centimeter hoog en weegt ongeveer 1,5 kilo.

### **Aanwezigheid en effect in Europa**

Stand van zaken in 2015: de heilige ibis komt voor in Frankrijk, Italië en Spanje (Canarische eilanden).

#### Effect op biodiversiteit / ecosysteem

De heilige ibis is een omnivoor. Hij eet vooral amfibieën, schaaldieren, kleine knaagdieren, vissen, waterinsecten, insectenlarven en kuikens van andere vogelsoorten. Daardoor kan hij inheemse soorten bedreigen. In Frankrijk is waargenomen dat heilige ibis de eieren en kuikens eet van een groot aantal vogelsoorten zoals sterns, zilverreigers, eenden, zeevogels en steltlopers. Ook is nestcompetitie mogelijk. Indien hoge aantallen aanwezig zijn, kan eutrofiëring van de wetlands optreden.

#### Effect op ecosystemendiensten<sup>[2]</sup>

Er zijn geen effecten bekend.

#### Overige effecten

De vogel geeft enige geluidsoverlast en zoekt voedsel in afvalbakken. Er is enig risico op aanvaringen met vliegtuigen, gezien lichaamsgrootte en groepsgedrag.

Deze effecten waren aanleiding voor plaatsing van deze soort op de Unielijst van [EU-verordening 1143/2014](#).

Bron: [Europese risicobeoordeling](#)

## **Aanwezigheid en effect in Nederland**

Stand van zaken in 2015: sinds 2009 heeft de heilige ibis niet meer in Nederland gebroed. Na het verdwijnen van de broedpopulatie als gevolg van succesvolle terugvangst van ontsnapte individuen worden er geen grote aantallen heilige ibis meer gezien in Nederland (3-8 individuen in 2010-2013).

Effect op biodiversiteit / ecosysteem

De potentiële negatieve effecten op onze inheemse vogels en andere vertebraten is mogelijk niet zo hoog als voorheen gedacht werd. Deze effecten blijven waarschijnlijk gering door de afwijkende voedselkeuze en mogelijk ook door de beperkte concurrentie om broedplaatsen.

In 2001 is de heilige ibis voor het eerst waargenomen in het Natura 2000-gebied Botshol. Het is waarschijnlijk dat de meeste wetlands met een Natura 2000-status gekoloniseerd kunnen worden, evenals alle andere wetlands in Nederland (inclusief de Waddeneilanden).

Effect op ecosysteemdiensten<sup>[2]</sup>

Er zijn geen effecten bekend.

Overige effecten

Zie onder 'Europa'.

## **Wet- en regelgeving**

[EU-verordening 1143/2014](#)

De heilige ibis staat sinds augustus 2016 op de Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en gehouden. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

## **Wat te doen?**

Particulieren en dierentuinen die die deze soort al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten.

De NVWA ontwikkelt samen met provincies (en andere overheden), met water- en terreinbeheerders en andere experts eliminatie- en beheerplannen voor soorten op de Unielijst. Het gaat hierbij om plannen van aanpak voor de bestrijding van populaties die in de natuur aanwezig zijn (of waarbij vestiging in de toekomst kan plaatsvinden). Deze plannen worden gefaseerd gemaakt, te beginnen met de soorten die voor Nederland het meest relevant zijn. Zodra het (definitieve) plan klaar is, zal het hier beschikbaar worden gesteld voor download.

## **Meer info over de heilige ibis**

Oorsprongsgebied


Heilige ibis komt oorspronkelijk uit Afrika (ten zuiden van de Sahara) en Irak.

Habitat

Wetlands.

Introductieroute Europa  
Dierparken en privé-collecties.

Aanwezigheid in de EU



Introductieroute Nederland

De huidige vogels in de Nederlandse natuur zijn ontsnapt uit dierenparken en privé-collecties. Er bestaat de mogelijkheid dat enkele ibissen uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Ze kunnen immers grote afstanden afleggen.

Aanwezigheid in Nederland

In 2015: geen broedgevallen meer sinds 2009.

Eerste waarneming in de Nederlandse natuur: 2001 (in natuurgebied Botsholt).

Kans op introductie, vestiging en verspreiding

De kans op introductie in Nederland is sterk verminderd sinds de plaatsing op de EU-lijst in 2016. Introductie in Nederland is mogelijk door natuurlijke verspreiding uit buitenland (Frankrijk), maar daar moet de soort worden bestreden en zo mogelijk uitgeroeid. Het Nederlandse klimaat is geschikt voor heilige ibis en er is voldoende habitat aanwezig.

Risicobeoordeling

[Risicobeoordeling voor Nederland](#)

[Europese risicobeoordeling](#)

Bronnen

[Risicobeoordeling voor Nederland](#)

[Europese risicobeoordeling](#)

[Nederlands soortenregister](#)

EU-factsheet

Laatste update: 13-7-2016